

KULLANMA TALİMATI

PREPA-S sprey

Haricen (cilt üzerine) uygulanır.

- **Etkin madde** : Her 1 ml, 0.125 g dietilamin salisilat ve 0.025 g aessin içerir.
- **Yardımcı maddeler** : Gliserol, lavanta yağı, neroli yağı, izopropil alkol, etil alkol, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **PREPA-S nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PREPA-S'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PREPA-S nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PREPA-S'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. PREPA-S nedir ve ne için kullanılır?

PREPA-S, renksiz, berrak görünüşte çözelti içeren, cilde uygulanmak üzere tasarlanmış spreydir. Etkin madde olarak saponin grubundan aessin ve bir salisilik asit olan dietilamin salisilat içerir.

PREPA-S, püskürtme adaptörü ile birlikte 100 ml'lik polietilen plastik şişede, hasta kullanma talimatını da içeren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

PREPA-S,

- Sportif faaliyetler ya da günlük yaşamda çarpma, çarpışma gibi travma sonucu oluşan ezik, çürük, burkulma, hematoma (bir çeşit iç kanama) ve tenosinovit (tendon ve onu saran kılıfın iltihabı) durumlarında,
- Kas ve kemik ağrılarında
- Omurga kemiğinin ağrılı durumlarında, örn: servikal sendrom, sırt ağrısı, bel ağrısı, siyatik sinir ağrısı
- Yüzeysel damar iltihabı ve variköz damarların (örn:varis) tedavisinde,
- Enjeksiyon veya infüzyon sonrası damarlarda şişmenin önlenmesi, olası şişliğin tedavisinde, endikedir.

2. PREPA-S'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PREPA-S'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

- Dietilamin salisilat, aessin ya da sprey bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız var ise, (Alerjik reaksiyon, deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
- Aspirine alerjiniz var ise,
- Işın tedavisi görüyorsanız,
- Uygulama yerinde ciddi enfeksiyon ya da yaralanma varsa,

PREPA-S'i kullanmamalısınız.

PREPA-S'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer,

- Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
- Emziriyorsanız,
- Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa , dikkatli kullanınız.

PREPA-S'in 5 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PREPA-S'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

PREPA-S, uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız PREPA-S kullanmadan önce doktorunuza danışınız. PREPA-S'i hamilelikte sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız PREPA-S'i sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

PREPA-S'in, araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

PREPA-S'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PREPA-S'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, PREPA-S kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

PREPA-S, etil alkol ve gliserol içermektedir. Fakat uygulama yöntemi açısından bu madde ile ilgili herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Yüksek doz aspirin alıyorsanız mide kanaması riskinde artış olabilir.

Pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar ile (varfarin) birlikte kullanırsanız kanama zamanınız uzayabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PREPA-S nasıl kullanılır?

PREPA-S'i daima doktorunuzun tarif ettiği şekilde, şişeyi uygulama yerinden yaklaşık 15 cm kadar uzak tutarak, iki ya da üç kez kısa süreli püskürterek uygulayınız. Aynı bölgeye yapılacak yeni uygulama öncesinde en az 2 saat süreyle beklenmesi önerilmektedir. Gerektiğinde gün içerisinde 4-6 uygulama yapılabilir.

PREPA-S özellikle yüze, göze, mukoz membranlara ve deride hassas bölgelere uygulanmamalıdır. Solunumundan kaçınılmalıdır. Tekrarlanan uygulamaları rahatsızlık yaratabileceğinden, uygulamalar aralıklı olmalıdır. Deri hassasiyetinin sıcak banyo sonrası ya da sıcak havalarda artacağı unutulmamalıdır. Uygulama yerinin tahriş olması durumunda kullanımına son verilmelidir.

Doktorunuzun belirlediği miktardan fazlasını kullanmayınız. Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz günde dört kez uygulamaya kadar kullanmanızı önerebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

PREPA-S, deri üzerine püskürtülerek uygulanır. PREPA-S uygulandığında hızla deriye emildiğinden, deriye geçişini kolaylaştırmak için ovulması gerekmemektedir. Daha fazla etki için uygulamadan sonra uygulama yerinin pamukla kapatılması ve sarılması önerilmektedir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

PREPA-S'nin 5 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa geniş yüzeylerde uzun süreli kullanımından kaçınmanız gerekir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer PREPA-S'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PREPA-S kullandıysanız:

PREPA-S'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Size verilen dozdan fazlasını uyguladıysanız, ya da aşırı doz kullanımında, endişelenmeyiniz. Uygulama bölgesini ılık ya da soğuk su ile yıkayınız.

Ancak kazayla yutulması durumunda, kullandığınız PREPA-S ambalajını da yanınıza alarak derhal doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

PREPA-S'yi kullanmayı unutursanız:

İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmalısınız. Daha önceki uygulamanın üzerinden iki saat geçtiyse diğer uygulamanızı yapmanızda sakınca yoktur. Bir sonraki dozunuzu, yine en az iki saat sonra uygulayarak, tedavinize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PREPA-S ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

PREPA-S tedavisini sonlandırdığınızda beklenen bir etki bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PREPA-S'in de, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, yan etkileri olabilir.

Her 10.000 kişiden birini etkileyebilecek çok seyrek yan etkiler aşağıdadır:

- Döküntü, kaşıntı, ürtiker, yüz, dudak, el/ayakta şişme, göğüs sıkışması, nefes darlığı, baygınlık hali ve/veya yüksek ateş gibi alerjik durumlar

Görülebilirlik sıklığı bilinmeyen yan etkiler aşağıdadır:

- Bir tür deri hastalığı (kontakt dermatit)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PREPA-S'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

PREPA-S iyi tolere edilmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bildirilen istenmeyen bir etki bulunmamaktadır. Kullanma talimatlarına uyulmadığında deride tahriş olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PREPA-S'nin Saklanması

PREPA-S'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Güneş ışığından korunmalı ve gölge yerlerde saklanmalıdır. Ateşten uzak tutulmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajlardaki son kullanma tarihinden sonra PREPA-S'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PREPA-S'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Dr. F. Frik İlaç San. A.Ş.
Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 42
34854 Küçükyalı-İstanbul

Üretim yeri:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No:219
34510 Esenyurt - İstanbul

Bu kullanma talimatı 16.07.2010 tarihinde onaylanmıştır.