

KULLANMA TALİMATI

RABECOMB 20 /30 mg MR kapsül

Ağız yolu ile alınır.

- **Etkin madde:** Her bir kapsül 20 mg rabeprazol sodyum ve 30 mg domperidon (domperidon pellet'e eşdeğer) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Magnezyum oksit, Mannitol DC (E421), mısır nişastası, povidon K30, hidroksipropil selüloz LH11, sodyum stearil fumarat, hipromeloz E15, talk, hipromelloz ftalat (HP55s), trietil sitrat, titanyum dioksit (E171), Şeker, Sarı demir oksit (E172iii), Jelatin, Indigo carmine FD&C Blue 2 (E132) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***RABECOMB MR nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***RABECOMB MR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***RABECOMB MR nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***RABECOMB MR'ın saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. RABECOMB MR nedir ve ne için kullanılır?

- RABECOMB MR etken madde olarak 20 mg rabepazol sodyum ve 30 mg domperidon ihtiva eder.
- RABECOMB MR'ın içeriğindeki rabepazol sodyum etken maddesi, proton pompası inhibitörü olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midede asit oluşumunu azaltır. RABECOMB MR'ın içeriğindeki domperidon reseptör antagonisti olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Mide ve bağırsaklardaki hareketleri hızlandırarak yiyecek ve asitlerin mide dışına daha çabuk çıkarılmasını sağlayarak çalışır.
- RABECOMB MR, içerisinde rabepazol enterik kaplı tablet ve domperidon pellet bulunan 30 kapsül Poliamid / Alüminyum / PVC blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

RABECOMB MR,

- Eroziv reflü özofajit (mide suyunun yemek borusuna kaçması sonucu yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı),
- Gastroözofajiyal reflü hastalığının uzun süreli tedavisi,
- Gastroözofajiyal reflü hastalığının belirtilerinin (mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı mide yanması ve kusma gibi hastalık belirtileri) tedavisinde kullanılır.

2. RABECOMB MR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İlaç kullanımı ile ortaya çıkan veya daha önceden olan problemler veya alerjiler hakkında doktorunuza danışınız.

RABECOMB MR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Rabepazol, domperidon maleat veya kapsülün bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa,
- Diğer proton pompası inhibitörlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
- Hamile iseniz ya da emziriyorsanız,
- Ciddi bir mide probleminiz varsa ya da mide ya da bağırsak kanaması geçirdiğinizi düşünüyorsanız (bu durumda melena olarak tabir edilen sürekli siyah dışkı oluşur.) ya da mide ve bağırsağınızda tıkanma veya hasar olduğunu düşünüyorsanız (sıklıkla karında şiddetli kramplar oluşur),
- Prolaktin salgılayan hipofiz tümörünüz (prolaktinoma) varsa,
- Aynı zamanda ketokonazol, eritromisin, flukonazol, vorikonazol, klaritromisin, amiodaron ve telitromisin gibi ilaçlar almakta iseniz.

RABECOMB MR'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer;

- Habis (kötü huylu) tümör bulunma ihtimali varsa,
- Diđer proton pompası inhibitörleri (midenin asit salgılama miktarını kontrol altına alan ilaçlar) veya benzimidazollerle (midenin asit salgılama miktarını kontrol altına alan bir ilaç) apraz aşırı duyarlılık riskiniz varsa,
- řiddetli karaciđer bozukluđunuz veya karaciđer fonksiyon bozukluđu öykünüz varsa,
- Digoksin (kalp tedavisinde kullanılan ilaç) veya ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılan ilaç) gibi ilaçlar kullanıyorsanız,
- Depresyon ve tansiyon yüksekliđi nedeniyle ilaç olarak MAO (monoaminooksidaz) inhibitörlerinden birini kullanıyorsanız,
- Sizde veya ailenizde meme kanseri hikayesi varsa,
- Karaciđer ya da böbrekte işlev azalması veya yetmezlik söz konusu ise, RABECOMB MR'ı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danıřmalısınız (Genellikle bir doz ayarlaması gerekli olacak ya da doktorunuz RABECOMB MR kullanmamanızı önerecektir.)
- Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız,
- Mide ya da yemek borunuzda habis hastalık (tümör) varsa.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

RABECOMB MR'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması

RABECOMB MR sabahları aç karnına yemeklerden önce alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

RABECOMB MR hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

RABECOMB MR emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

RABECOMB MR kullanırken uyuklama nedeniyle dikkati toplamada azalma görülürse, araba ve dikkat gerektiren makineleri kullanmaktan kaçınılması önerilir.

RABECOMB MR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

RABECOMB MR her dozunda 1 mmol (23 mg)'den az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

RABECOMB MR, 24 mg mannitol (E421) içermektedir, ancak dozu nedeni ile uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- Azol grubu ilaçlar (mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır; örn., ketokonazol veya itrakonazol)
- Digoksin (kalp yetmezliği ve atım bozukluğu tedavisinde kullanılır)
- Atazanavir (insan immün yetmezlik virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılır)
- Makrolid grubu antibiyotik ilaçlarla (örn., eritromisin),
- AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsüne karşı geliştirilmiş ilaçlarla (örn., ritonavir),
- Antikolinergikler (sinir sistemini etkileyen ilaçlar),
- QT aralığını uzatan ilaçlar (amiodaron, tioridazin, mezoridazin)

kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar RABECOMB MR ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. RABECOMB MR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

RABECOMB MR'ı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz başka şekilde önermemiş ise;

Eroziv reflü özofajit (mide suyunun yemek borusuna kaçması sonucu yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı) tedavisinde günde bir kez bir kapsüldür.

Gastroözofajiyal reflü hastalığının uzun süreli tedavisinde günde bir kez bir kapsüldür.

Gastroözofajiyal reflü hastalığının belirtilerinin (mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı mide yanması ve kusma gibi hastalık belirtileri) tedavisinde günde bir kez bir kapsüldür.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsüller çiğnenmeden ya da kırılmadan bir bütün halinde 1 bardak su ile yutulmalıdır.

RABECOMB MR sabahları kahvaltıdan önce alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

RABECOMB MR'ın çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

RABECOMB MR'ın yetişkinlere önerilen dozu kullanılır.

Özel kullanım durumları:**Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda RABECOMB MR kullanımı önerilmemektedir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen doz günde bir kez bir kapsüldür.

Eğer RABECOMB MR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RABECOMB MR kullandıysanız:

Fazla miktarda RABECOMB MR aldığınızda derhal doktorunuzla temas kurmalı ya da en yakın hastaneye başvurmalısınız. Fazla miktarda RABECOMB MR alınması durumunda sersemlik, uyuşukluk, düzensiz göz hareketleri, sıracısı davranışlar ve/veya istemsiz hareketler, ritim kaybı (özellikle kalp atışında düzensizlik) ve tansiyon düşmesi gözlenebilir.

RABECOMB MR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RABECOMB MR'ı kullanmayı unutursanız:

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz. Beş günden daha uzun süre ilaç almayı unutursanız ilaç almadan önce doktorunuzu arayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RABECOMB MR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

RABECOMB MR'ı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Tedaviyi erken bırakmanız halinde şikayetleriniz tekrarlayabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RABECOMB MR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa RABECOMB MR'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Vücudunuzda yaygın alerjik belirtiler (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi)
- Kontrol edilemeyen hareketler (düzensiz göz hareketleri, sıra dışı davranışlar, titremeler ve kas sertliği gibi)
- Kalp ritim bozuklukları, çarpıntı (uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes)
- Baş ağrısı/migren

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RABECOMB MR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Hepatik ensefalopati (toksik azotlu bileşiklerin portal dolaşıma geçmesine bağlı olarak ortaya çıkan, karaciğer sirozu ile ilgili ensefalopati; serebral belirtileri arasında koma da yer alır)
- Toksik epidermal nekrolizis (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
- Karaciğer iltihabı
- Sarılık
- Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
- Göz çevresinde, parmaklarda, ayak bileklerinde şişkinlikler (periferal ödem)
- Beyaz kan hücrelerinde azalma ve/veya kan pıhtılarının oluşumu
- Nedeni belli olmayan morarmalar
- Steven Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, deride bül (şişlik) ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
- Karaciğer enzimlerinde artış
- İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)

- Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi
- Kandaki parçalı hücre sayısında azalma
- Akyuvar sayısında azalma
- Akyuvar sayısında artış
- Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma)
- Bronş iltihabı
- Kadınlarda adet gecikmesi
- Meme ağrısı, memeden süt gelmesi ve göğüs büyümesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Baş ağrısı, ishal ve bulantı
- Ağrılı idrar yapma
- Yutak (farinks) iltihabı
- Nezle, karın ağrısı, kuvvetsizlik, bağırsaklarda gaz,
- Kendiliğinden geçen barsak krampları
- Kusma
- Ağrı/sırt ağrısı
- Sersemlik
- Grip benzeri semptomlar, enfeksiyon
- Öksürük
- Kabızlık
- Uykusuzluk
- Döküntü
- Kas ağrısı
- Göğüs ağrısı
- Ağız kuruluğu
- Ağız içinde iltihap
- Hazımsızlık (sindirim bozukluğu)
- Geğirme
- Sinirlilik
- Uykululuk hali

- Sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı),
- Titremeler
- Bacakta kramplar
- İdrar yolu iltihapları
- Eklem ağrısı ve ateş
- İştahsızlık
- Gastrit (mide mukozası iltihabı)
- Kilo alma
- Depresyon
- Görme ve tat duyusu bozuklukları
- Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi)
- Deri üzerinde oluşan kızarıklık

Bunlar RABECOMB MR'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. RABECOMB MR'ın Saklanması

RABECOMB MR'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RABECOMB MR'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tozkoparan Mah. General Ali Rıza
Gürcan Cad. Merter İş Merkezi
Bağımsız Bölüm.No 2/6
Güngören/İSTANBUL
Tel: 0 212 481 40 98
Fax: 0 212 481 40 98
e-mail: info@celtilac.com.tr

Üretim Yeri: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. 1.Yol No:3
Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 25.01.2012 tarihinde onaylanmıştır.