

KULLANMA TALİMATI

FARMA CARBON® tablet

A ,zdan al,n,r.

- **Etkin madde:** Her tablette, 180 mg bitkisel kömür, 50 mg kükürt, 105 mg sinameki yapra , tozu, 25 mg , g,n ekstresi bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Kaolin, talk, gliserin, m,s,r ni astas,, aerosol 200, nane esans, ve rezene esans,.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **FARMA CARBON® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **FARMA CARBON®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **FARMA CARBON® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **FARMA CARBON®'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. FARMA CARBON® nedir ve ne için kullanılır?

FARMA CARBON®'ün içeri inde bulunan etkin maddeler sadece bitki ve mineral kökenlidir ve sindirim düzenleyici ve hafif laksatif (feçesi yumu atarak at,lmas,n, kolayla t,ran) etkiye sahiptir. Bitkisel kömür, sinameki yapraklar,n,n ve , g,n ekstresinin laksatif etkisiyle sonradan salg,lanan çe itli zararlı, metabolik maddelerin etkisini azaltma yetene ine sahiptir. Kükürt ayr,ca sindirim sisteminde hafif bir dezenfektan etki de göstermektedir.

FARMA CARBON®'ün hafif laksatif etkisi uygulamadan 8-10 saat sonra ortaya ç ,kmaktadır.

rritabl barsak sendromu diye adland,r,lan kab,zl,k, barsak ve kar,nda rahats,zl,k ile seyreden durumdan yak,nan az say,daki hastada FARMA CARBON® olumlu sonuçlar göstermi tir.

ÉFARMA CARBON®, 100 tablettan olu an blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, mat, grimsi siyah, hafif nane kokusunda, her iki taraf, bombeli (bikonveks) tabletler eklindedir.

FARMA CARBON®, a a ,daki durumlar,n tedavisinde kullan,l,r:

ÉBarsak geçi inin yava lamas,,

ÉBarsak t,kanmas,yla seyreden durumlar hariç kab,zl, ,n tüm formlar,,
Énce barsaktaki parçalanma ve fermentasyon süreci,

ÉMeteorizm (kar,n ve barsaklarda gaz varl, ,)

É i kinlik,

Éntestinal oto-intoksikasyon (barsaklarda kalan at,klara ba l, olarak görülen zehirlenme),

ÉHemoroidal (basura ba l, olarak geli en) kab,zl,k.

2. FARMA CARBON®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FARMA CARBON®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Éer FARMA CARBON®'ün herhangi bir bile enine kar , a ,r, duyarlı,ysan,z,

ÉBarsak t,kan,kl, ,n,z varsa,

ÉAkut yang,l, barsak hastal, ,n,z varsa,

ÉKökene bilinmeyen kar,n a r,n,z varsa,

ÉCiddi su ve elektrolit dengesi bozuklu unuz varsa,

É üpheli mide veya barsak ülseriniz varsa,

ÉApandisitte,

ÉHamilelikte ve süt verme döneminde,

É2 ya ,ndan küçük çocuklarda kullan,lmamal,d,r.

FARMA CARBON®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ÉGüvenli bir etki elde edilmesi için gereken doz bireyler aras,nda de i kenlik gösterebilir.

Éshal ortaya ç,kmas,n,n bir doz a ,m, belirtisi oldu unu göz önünde bulundurunuz,

ÉDoktorunuzun talimat, olmaks,z,n 1-2 haftadan daha uzun bir süre boyunca kullanmay,n,z.

ÉZay,flat,c, bir ajan olarak kullanmay,n,z, -

É4 günden daha uzun süreli kesintisiz uygulama durumunda ilac,n etkisi azalabilir.

Bu uyar,lar geçmi teki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza dan, ,n,z.

FARMA CARBON®'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

FARMA CARBON® yemek s,ras,nda veya yemekten sonra al,nabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FARMA CARBON® hamilelik dönemi boyunca kullan,lmamal,d,r.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FARMA CARBON®, emzirme dönemi boyunca kullan,lmamal,d,r.

Araç ve makine kullanımı

FARMA CARBON®'ün araç veya makine kullanma yetene i üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

É FARMA CARBON® kullan,m,na ba l, bir hipopotasemi (kanda potasyum seviyesi dü üklü ü) ortaya ç,kt, ,nda, kalp glikozidlerinin etkisi artmaktadır.

É FARMA CARBON®, barsaktan geçi i h,zlandırd, ,ndan birlikte kullan,lan ve barsaklardan emilen ilaçlar,n emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FARMA CARBON® nasıl kullanılır?

É Uygun kullan,m ve doz/uygulama s,kl, , için talimatlar:

Eri kinler ve 12 ya ,ndan büyük çocuklarda: Hafif bir laksatif ve purgatif (feçesin sulu kalmas,n, sa layarak h,zl, bir ekilde at,lmas,na neden olan) etki elde edilmesi için günde 3 defaya kadar 1-2 tablet kullan,l,r. Daha güçlü bir laksatif etki isteniyorsa ak am uygulanan doz 3-4 tablet FARMA CARBON® ekinde art,r,labilir. Günde 8 tablettten fazla al,nmamal,d,r.

Sindirim sistemindeki gaz,n eliminasyonu ve güçlü bir temizlenme için (örne in; röntgen, ilaçl, böbrek filmi v.b. tetkiklerden önce): Ak am al,nan 6-8 tablet FARMA CARBON® dan sonra bol miktarda s,v, al,nmal,d,r.

Uzun dönemli, kesintisiz kullan,m, sonucunda etkide bir azalma ortaya ç,kabilir. Doktorunuz FARMA CARBON® ile tedavinizin ne kadar sürece ini size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu: Tabletler, yemek s,ras,nda ya da yemekten sonra bol miktarda s,v, ile al,nmal,d,r.

• Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı: 12 ya ,ndan küçük çocuklarda kullan,lmamal,d,r.

Yaşlılarda kullanımı: Ya l, hastalarda kullan,m,na ili kin özel bir durum bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezli i olan hastalarda özel bir kullan,m, yoktur.

Karaciğer yetmezliği: Karaci er yetmezli i olan hastalarda özel bir kullan,m, yoktur.

Eğer FARMA CARBON®'un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FARMA CARBON® kullandıysanız

A ,r, doz durumunda olu abilecek ba l,ca belirti ishaldir. Bu durumda ilaç b,rak,lmal, veya dozaj azalt,lmal,d,r.

FARMA CARBON®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FARMA CARBON®'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FARMA CARBON® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FARMA CARBON®'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa FARMA CARBON®'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, dudakta, yüzde, boğazda ve dilde şişme, yutma veya nefes alma güçlüğü (anafilaksi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FARMA CARBON®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

Önerilen dozda kullanıldığında yan etkiler çok nadirdir (karın ağrısı, ve ishal görülebilir),

Alkali reaksiyonda, zaman zaman idrarın soluk kırmızı, bir renk aldığı, gözlenebilir ve bu durum klinik açıdan anlamlıdır,

Çok seyrek olarak bulantı veya kusma görülebilir. Bu durum, doz aşımının bir belirtisi olabilir.

Uzun bir süre boyunca yüksek dozlarda kullanıldığında, zamanla potasyum olmak üzere, elektrolit kayıpları ortaya çıkabilir ve bu da barsak geçişinde yavaşlamaya, daha da artabilir (barsak hareketlerinin kaybı ve kabızlık).

Bunlar FARMA CARBON®'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ilaç Yan Etki Bildirimi ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'e bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlanacaktır.

5. FARMA CARBON®'un saklanması

FARMA CARBON®'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra FARMA CARBON®'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayii A. . Okmeydan,, Borue i Sokak, No: 16
34382 i li- STANBUL
Tel: (+90 212) 220 64 00
Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A. .
Sofale me Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekap,- STANBUL
Tel: (+90 212) 534 79 00
Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimat, í /í /í tarihinde onaylanm, t,r.