

KULLANMA TALİMATI

GYNO-TROSYD® 100 mg vaginal tablet

Vajina içine uygulanır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 100 mg tiokonazol içerir.
- **Yardımcı madde(ler):** Laktoz, mısır nişastası, saf su, magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. *GYNO-TROSYD nedir ve ne için kullanılır ?*
2. *GYNO-TROSYD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *GYNO-TROSYD nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir ?*
5. *GYNO-TROSYD'in saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. GYNO-TROSYD nedir ve ne için kullanılır?

GYNO-TROSYD vajinal tablet olup tiokonazol etkin maddesini içermektedir. 3 aplikatör içeren ambalajlarda sunulmuştur.

GYNO-TROSYD, mantar hastalıklarına karşı etkili antifungal adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

GYNO-TROSYD vajinal tablet, vajinal maya enfeksiyonlu hastaların lokal tedavisi için endikedir.

2. GYNO-TROSYD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GYNO-TROSYD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer daha önce imidazol grubu mantar hastalıklarına karşı etkili antifungal ajanlara veya deri preparatlarındaki diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet göstermişseniz.

GYNO-TROSYD'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer,

- Hamileliđin ilk üç ayındaki dönemdeyseniz. gebelik ile iliřkili bir tür mantar hastalıđı olan vajinal kandidiyazisin tedavisinde etkili olduđu gösterilmiřtir fakat her ila gibi kullanırken dikkatli olmalısınız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

GYNO-TROSYD'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

GYNO-TROSYD haricen kullanılır. Yemeklerle etkileřim beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

GYNO-TROSYD'in gebelik ile iliřkili bir tür mantar hastalıđı olan vajinal kandidiyazisin tedavisinde etkili olduđu gösterilmiřtir fakat her ila gibi gebeliđin ilk üç ayında kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Hamile iseniz, ilacın kullanılıp kullanılmayacađını doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Bu ilacın anne sütü ile atılıp atılmadıđı bilinmemektedir. Bir ok ila anne sütüne getiđinden, GYNO-TROSYD uygulaması sırasında emzirmeye geici olarak ara vermelisiniz.

Ara ve makine kullanımı

Bilinen bir etkisi yoktur.

GYNO-TROSYD'in ieriđinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün kullanımı itibariyle uyarı gerektirecek bir yardımcı madde iermemektedir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Diđer ilalarla bilinen bir etkileřimi yoktur.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GYNO-TROSYD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı için talimatlar:

GYNO-TROSYD vajinal tablet belirlenen tedavi süresince her gece yatarken bir defa, beraberce verilen aplikatörü kullanarak tatbik edilmelidir. GYNO-TROSYD 3, 6, 14 günlük tedavi sonunda genellikle etkilidir. ođu hastada 3 günlük tedavi yeterlidir.İlk tedaviden sonra iyileřmeyen fakat

gelişme gösteren hastalarda devam eden 3 günlük tedavi etkili olabilir. Az akıntı olan vajinal kandidiaz'da tablet yerine tercihen krem uygulanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

GYNO-TROSYD sadece intra-vajinal olarak uygulanır. Vajinal tabletler tercihen regl devresi dışında, aplikatör ile haznenin derinine uygulanmalıdır

Kullanım için talimatlar:

1. Aplikatörün pistonunu durana kadar çekiniz. Bir vajinal tablet aplikatöre yerleştiriniz.
2. Aplikatörü sırtüstü yatar vaziyette dizleri kaldırarak yerleştiriniz.
3. Tablet yerleştirilmiş aplikatörü vajen içine mümkün olduğu kadar derine yerleştiriniz.
4. Pistonu iterek tabletin vajene yerleşmesini sağlayınız. Daha sonra aplikatörü çıkarınız.
5. Bu tedavi belirlenen süre boyunca tercihen yataga gitmeden önce tekrar edilmelidir.
6. Uygulamanın sonunda kullanılmış aplikatör çıkartılıp atılır ve her uygulamada yeni aplikatör uygulanır.
7. Kaşınma ve yanma hemen ortadan kaybolur fakat uygulamanın belirlenen süre boyunca devam etmesi önemlidir.
8. Adet sürenize denk gelse de tedaviyi sürdürünüz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklardaki etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

Yeterli veri mevcut değildir

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Yeterli veri mevcut değildir

Eğer GYNO-TROSYD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GYNO-TROSYD kullandıysanız

GYNO-TROSYD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GYNO-TROSYD'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GYNO-TROSYD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, GYNO-TROSYD kullanmaya devam ediniz.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GYNO-TROSYD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GYNO-TROSYD'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani aşırı duyarlılık tepkisi :Yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri, döküntü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GYNO-TROSYD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

GYNO-TROSYD lokal uygulamada iyi tolere edilir ve ilacın deri üzerindeki uygulanmasında hiç bir sistemik yan etki gözlenmemiştir. Bazı hastalarca geçici veya hafif lokal yanma belirtileri bildirilmiştir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Ciltte veya yüzde kaşınma, şişme veya kabarmayı içeren alerjik reaksiyon
- Uyuşma
- Karın ağrısı
- Döküntü
- Ağrılı ve sık idrara çıkma
- Genital ödem
- Genital kaşıntı
- Vajinal kanama
- Vajinal kuruluk
- Vajinal rahatsızlıklar (vajinal ağrı / acıma, vajinada şişme, vajinal kızarıklık, vajinal irritasyon, vajinal akıntı, vajinal yanma ve vajinal kaşıntı)
- Vajina iltihabı
- Vulva rahatsızlıkları (vulva irritasyonu, vulva ödemi, vulva ağrısı, vulva yanması dahil ve vulvit)
- Ödem
- Ağrı
- Kaşıntı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. GYNO-TROSYD'in saklanması

GYNO-TROSYD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GYNO-TROSYD'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi ve Üretici:

PFIZER İlaçları A.Ş. 34347 Ortaköy –İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.