

KULLANMA TALİMATI

XPECTO 300 mg saşe

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde** : 300 mg asetilsistein
- **Yardımcı maddeler** : Sodyum bikarbonat, sitrik asit anhidrat, mannitol, aspartam, portakal aroması, beta karoten.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. XPECTO nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. XPECTO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. XPECTO nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. XPECTO'nun saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. XPECTO nedir ve ne için kullanılır?

XPECTO'nun etkin maddesi asetilsistein; bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Solunum yollarında mukolitik (balgam kıvamını azaltarak, atılımını kolaylaştırıcı) etki gösterir.

XPECTO yoğun kıvamlı balgamin atılması, azaltılması ve ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner hastalıklarda kullanılır. Ayrıca yüksek doz

parasetamol alımına baęlı olarak ortaya ıkan karacięer yetmezlięinin nlenmesinde kullanılır.

2. XPECTO'yu kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler

XPECTO'yu aŐaęıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eęer;

- Asetilsisteine veya yukarıda belirtilen ilacın bileŐimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karŐı aŐırı duyarlılıęınız varsa, eęer hangisinin sizin iin zararlı olduęunu bilmiyorsanız veya emin deęilseniz kullanmayınız.
- XPECTO'nun yeni doęmuŐ bebeklerde kullanımı uygun deęildir.

XPECTO'yu aŐaęıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer;

- Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız XPECTO'yu kullanmadan nce mutlaka doktorunuza danıŐınız,
- Astım hastasıysanız XPECTO'yu kullanmadan nce mutlaka doktorunuza baŐvurunuz,
- Emziriyorsanız,
- Karacięer rahatsızlıęınız varsa XPECTO'yu kullanmadan nce doktorunuza danıŐınız,
- Peptik lser (mide ve barsak baŐlangıcında yara) ve zofagus varisi (yemek borusunda toplardamar geniŐlemesi) gibi rahatsızlıklarınız varsa kullanmadan nce doktorunuza danıŐınız,
- Bulantı ve kusmaya eęilimi oluŐturabilecek herhangi bir rahatsızlıęınız varsa XPECTO'yu kullanmadan nce doktorunuza danıŐınız. ünkü XPECTO bulantı ve kusmayı arttırabilir.
- ksrk refleksi yeterli deęilse doktorunuza danıŐınız.

Bu uyarılar, gemiŐteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıŐınız.

XPECTO'nun yiyecek ve iecek ile kullanılması:

XPECTO a karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.

Asetilsistein'in anneye veya bebeęe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadıęı tam olarak

bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız XPECTO'yu kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Asetilsistein'in anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

XPECTO'nun araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

XPECTO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

XPECTO'nun içeriğinde bulunan aspartam, fenilketonüri hastaları için zararlıdır. Fenil ketonüri hastasıysanız XPECTO'yu kullanılmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Bu tıbbi ürün her saşesinde 15.06 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- XPECTO'nun antisekratuar (vücut salgısı salımını engelleyeci) ve antitussif (öksürük giderici) ilaçlarla beraber kullanılması uygun değildir.
- XPECTO'nun antibiyotik grubu ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır. İki ilacın birlikte kullanılmaları gerekiyorsa alınmaları arasında 2 saatlik bir süre olmalıdır.
- Parasetamol zehirlenmelerinde XPECTO kullanımını sırasında bulantı ve kusma oluşabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. XPECTO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış salgılamayı azaltmak ve balgam atılımı kolaylaştırmak amacıyla:

14 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde; günde 2 kez 1 saşe veya günde 1 kez 2 saşe birden uygulanır.

2-14 yaş arası çocuklarda; günde 1 kez 1 saşe uygulanır.


2 yaşından küçük çocuklarda etkin madde miktarı yüksek olduğundan XPECTO 300 mg kullanılmamalıdır.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.


Uygulama yolu ve metodu:

XPECTO yalnızca ağız yoluyla kullanılır.


XPECTO aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.




1 saşe XPECTO su bardağı içerisine boşaltılır.



Üzerine bardağın yarısına kadar (100 ml) içme suyu eklenir.



İlacı karıştırılarak çözünmesi sağlanır.



Tamamen çözülmüş olan dibinde tortu kalmayan çözelti hazırlandıktan hemen sonra içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

2-14 yaş arası çocuklarda; günde 1 kez 1 saşe uygulanır.

2 yaşından küçük çocuklarda etkin madde miktarı yüksek olduğundan XPECTO 300 mg kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

- XPECTO daha fazla nitrojenli maddenin sağlanması için kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.
- Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa XPECTO'yu kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
- İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.
- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
- Doktorunuz XPECTO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü XPECTO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer XPECTO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla XPECTO kullandıysanız:

XPECTO aşırı dozda alındıysa mide yanması, kusma ve diyareye yol açabilir.

XPECTO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

XPECTO'yu kullanmayı unutursanız:

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir saşe alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

XPECTO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

XPECTO tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, XPECTO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, XPECTO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncında düşme gibi)
- Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar). Ayrıca, çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin XPECTO'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında)
- Cilt kızarıklıkları veya tahrişleri (iritasyon)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Ağız iltihabı
- Karın ağrısı
- Bulantı
- Kusma
- İshal
- Baş ağrısı
- Ateş

Bunlar XPECTO'nun çok nadir görülen yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. XPECTO'nun saklanması

XPECTO'yu çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altında, oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra XPECTO'yu kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya poşette bozukluklar fark ederseniz XPECTO'yu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : Drogan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3
Balgat-ANKARA

Üretim yeri : Drogan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
06760 Çubuk/ANKARA

Bu kullanma talimatı 12/05/2011 tarihinde onaylanmıştır.