

KULLANMA TALİMATI

TERKUR krem, 30 g

Cilt üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 g krem 190 mg alüminyum hidroksiklorit içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Beyaz yumuşak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat, gliserinmonostearat, siklometikon, sıvı parafin, polisorbat 20, polisorbat 80, triklozan, klorheksidin hidroklorür, butil hidroksianizol (E320), parfüm (koku maddesi), saf su.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de TERKUR'dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya gereksinim duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **TERKUR nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TERKUR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TERKUR nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TERKUR'un saklanması**

başlıkları yer almaktadır.

1. TERKUR nedir ve ne için kullanılır?

TERKUR, haricen kullanıma yönelik bir kremdir. Antiseptik ve Dezenfektanlar - Alüminyum ajanları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak, 1 gramında 190 mg alüminyum hidroksiklorit içermektedir.

Alüminyum hidroksiklorit, terlemeyi önleyici, bakterilere ve mantarlara karşı etkili bir bileşiktir.

TERKUR, hafif parfüm kokulu, beyaz renkli, bağdaşık (homojen) özelliklerde olup, 30 g krem içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.

TERKUR, her türlü aşırı terlemenin (hiperhidrozis) tedavisinde; özellikle koltuk altı, ayak ve ellerde görülen aşırı terleme ve buna bağlı gelişen koku yayılmasına karşı; ayrıca vücudun kıvrımlı yerlerinde oluşan yüzeysel iltihapların (intertrigo) ve yürüyüşe bağlı olarak ayaklarda oluşabilen içi sıvı dolu kabarcıkların önlenmesinde kullanılır.

2. TERKUR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TERKUR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Alüminyum hidroksiklorite veya TERKUR'un herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise, TERKUR'u kullanmayınız.

TERKUR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Cildinizde tahriş, aşırı kuruluk veya aşırı hassasiyet olursa durumu hekiminize bildirin.
- İltihaplanmış deride ve açık yaraların üzerine TERKUR uygulamasından kaçınınız.
- TERKUR'u gözlerle temas ettirmeyiniz.
- TERKUR'u kumaşlar ile temas ettirmeyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TERKUR'un yiyecek ve iecek ile kullanılması:

TERKUR'un yiyecek ve ieceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Alüminyum hidroksikloritin hamilelerde kullanımının cenine zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.
- TERKUR kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Alüminyum hidroksikloritin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
- Alüminyum hidroksikloritin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.
- TERKUR tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, fayda / zarar oranı dikkate alınmalıdır.

Ara ve makine kullanımı

TERKUR kullanımının ara ve makine kullanımına bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

TERKUR'un ieriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TERKUR'un ieriğinde bulunan;

- Butil hidroksianizol (E320), bölgesel cilt tepkimelerine (örneğin temas dermatitine) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahriş
- Setostearil alkol ise, bölgesel cilt tepkimelerine (örneğin temas dermatitine) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TERKUR'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TERKUR nasıl kullanılır?


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzca başka türlü önerilmediği takdirde, TERKUR'u akşamları yatmadan önce uygulayınız.

TERKUR'u ilk 3-4 gün günde 1 kez, sonrasında ise her 2 veya 3 günde 1 kez geceleri kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

TERKUR'u; yalnızca bölgesel olarak, aşırı terleme görülen bölgelere sürerek uygulayınız.



Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda TERKUR'un etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda TERKUR'un etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda TERKUR'un kullanımı araştırılmamıştır.

Eğer TERKUR'un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TERKUR kullandıysanız:

TERKUR, önerilen dozdan fazla kullanıldığı durumda ciltte aşırı kuruluğa neden olabilir. Kullanılan TERKUR miktarının ve kullanım sıklığının azaltılmasıyla bu durum kolaylıkla normal hale dönebilmektedir.

TERKUR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer TERKUR'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

TERKUR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Böyle bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, TERKUR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TERKUR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciddi alerjik tepkimeler (döküntü, kurdeşen, kaşıntı, nefes almada zorluk, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişme).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TERKUR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Ciltte aşırı kuruluk,
- Tedavi edilen alanlarda geçici yanma, kaşıntı, iğne batması hissi, karıncalanma.

Bunlar TERKUR'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TERKUR'un saklanması

TERKUR'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra TERKUR'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10010 Sok. No.10,
35620 Çiğli / İZMİR

Üretici : ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10010 Sok. No.10,
35620 Çiğli / İZMİR

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.

(gün ay yıl)