

KULLANMA TALİMATI

PAVULON 2 mg/ml, Enjeksiyonluk çözelti
Damar yolu ile kullanılır.

- **Etkin madde:** Her ml PAVULON 2 mg panküronyum bromür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum asetat, sodyum klorür, asetik asit ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **PAVULON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PAVULON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PAVULON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PAVULON'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. PAVULON nedir ve ne için kullanılır?

PAVULON, kas gevşeticileri olarak adlandırılan ilaç grubunun bir üyesidir.

PAVULON Enjeksiyonu, sezaryen dahil olmak üzere ameliyat sırasında ve yoğun bakımda kasların gevşetilmesi için kullanılır.

2. PAVULON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAVULON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer panküronyuma, bromür iyonuna ya da PAVULON'daki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

Böyle bir özelliğe sahipseniz, anesteziistinize söyleyiniz.

PAVULON'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Tıbbi gemiřiniz, PAVULON'un sizde kullanılmasını etkileyebilir. Eđer sizde ařađıdaki zelliklerden biri varsa ya da daha nce mevcut olmuřsa, uzman doktorunuza syleyiniz:
 - kas gevřeticilere karřı alerji
 - bbrek fonksiyonunda azalma veya bbrek hastalıđı
 - kalp hastalıđı, yksek tansiyon
 - dem (sıvı tutması, rneđin ayak bileklerinizde řiřlik olması)
 - karaciđer veya safra kesesi hastalıđı ya da karaciđer fonksiyonunda azalma
 - sinirleri veya kasları etkileyen hastalıklar (myastenia gravis)
- Belirli tıbbi durumlar, PAVULON'un etki mekanizması tzerinde etkili olabilir. rneđin:
 - kandaki potasyum dzeylerinin dřk olması
 - kandaki magnezyum dzeylerinin yksek olması
 - kandaki kalsiyum dzeylerinin dřk olması
 - kandaki protein dzeylerinin dřk olması
 - vcudunuzun su kaybetmiř olması (dehidrasyon)
 - kanda ok fazla asit bulunması
 - kanda ok fazla karbondioksit bulunması
 - genel hastalık - sađlık durumunuzun bozuk olması
 - ařırı kilolar
 - yanıklar
 - vcut sıcaklıđınızın ok dřk olması (hipotermi)

Eđer bu durumlardan herhangi biri sizde varsa, anesteziistiniz sizde kullanılacak PAVULON dozunu belirlerken bunu gz nnde tutacaktır.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

Hamilelik

Hamileyseniz veya hamile olma olasılıđınız varsa bunu anesteziistinize bildiriniz. Anesteziistiniz size PAVULON verebilir ama nce durumunuzu kendisine bildirmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Eđer emziriyorsanız, bunu anesteziistinize bildiriniz. Anesteziistiniz size PAVULON verebilir ama nce durumunuzu kendisine bildirmelisiniz.

Ara ve makine kullanımı

Doktorunuz PAVULON verilmesi sonrasında ne zaman gvenli bir řekilde ara ve makine kullanabileceđinizi size bildirecektir. Ayıldıktan sonraki 24 saat iinde ara ve makine kullanılması nerilmez.

PAVULON'un ierisinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
PAVULON her ampulde 23 mg'dan daha az sodyum ierir, bu nedenle tuz iermez olarak kabul edilebilir.

Diğer ilalar ile birlikte kullanımı

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı Őu anda kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise anesteziistinize söyleyiniz. Bu bilgi doktorunuzun sizde kullanması gereken PAVULON dozunu hatasız bir Őekilde belirlemesine yardımcı olacaktır.

AŐağıdaki ilalar PAVULON'un etkilerinde deęiŐiklik yapabilir:

- PAVULON'un etkilerini artıran ilalar:
 - Yoęun Bakım Bölümü'nde belirli anti-enflamatuvar ilaların (kortikosteroidlerin), PAVULON ile birlikte uzun süre kullanılması
 - bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan belirli ilalar (antibiyotikler)
 - bipolar bozuklukta kullanılan belirli ilalar (lityum)
 - kalp hastalıklarının veya tansiyon yükseklięinin tedavisinde kullanılan belirli ilalar (kinidin, kalsiyum antagonistleri, beta-bloker ajanlar)
 - sıtma tedavisinde kullanılan belirli ilalar (kinin)
 - idrar söktürücü ilalar (diüretikler)
 - magnezyum tuzları
 - lokal anestetikler (lidokain, bupivakain)
- PAVULON'un etkilerini azaltan ilalar:
 - sara ilalarının uzun süre kullanılması (fenitoin ve karbamazepin)
 - pankreas iltihabında, kan pıhtılaŐması bozukluklarında, akut kan kaybında kullanılan ilalar (proteaz inhibitörleri: gabeksat, ulinastatin)

Ameliyat öncesinde veya sırasında size PAVULON'un etkilerinde deęiŐiklik yapabilecek daha baŐka ilalar da verilebilir. Bunlar belirli anestetikleri, diğer kas gevŐeticilerini ve fenitoin gibi ilaları iermektedir.

PAVULON aŐağıdaki ilaların etkilerinde deęiŐiklik yapabilir:

- Lokal anestetiklerin (lidokain) etkileri artabilir

Eđer reeteli yada reetesiz herhangi bir ilacı Őu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PAVULON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Anesteziist, ihtiyaç duyduęunuz PAVULON dozunu, aŐağıdaki faktörlere göre belirleyecektir:

- Kullanılacak anesteziğin tipi
- Ameliyatın beklenen süresi
- Almakta olduęunuz diğer ilalar
- Saęlık durumunuz

PAVULON size, cerrahi girişim öncesinde ve/veya sırasında verilecektir. Genellikle kullanılan doz, vücut ağırlığınızın her kilogramı için 0.08-0.1 mg panküronyum bromürdür ve bu dozun etkisi 75-100 dakika devam eder. Cerrahi girişim sırasında PAVULON'un etkisinin devam edip etmediği kontrol edilecektir. İhtiyaç duyduğunuzda size ilave dozlar verilebilir

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

PAVULON sizin, kendi başınıza kullanacağınız bir ilaç değildir. PAVULON bir toplardamara, çözelti şeklinde enjekte edilir. Tek bir doz olarak ya da devamlı damara zerk şeklinde verilebilir.

Enjeksiyonlar bir doktor veya bir hemşire tarafından yapılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: PAVULON çocuklarda da kullanılabilir ama anesteziistinizin önce tıbbi geçmişinizi değerlendirmesi gerekir.

Yaşlılarda kullanımı: PAVULON yaşlılarda da kullanılabilir ama anesteziistinizin önce tıbbi geçmişinizi değerlendirmesi gerekir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalara, sağlıklı insanlara verilen doz ile aynı doz verilebilir. Ancak bu grup hastalarda, etkinin başlaması yavaş olabilir ve ilacın kas gevşetici etkisi uzayabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PAVULON kullandıysanız

Size PAVULON verilirken durumunuz sağlık personeli tarafından yakından izleneceğinden çok fazla PAVULON kullanmanız uzak bir olasılıktır. Ancak böyle bir durum gerçekleşirse, tekrar kendi kendinize solunum yapmaya kadar yapay solunum devam edecektir. Fazla miktarda verilmiş olan PAVULON'un etkilerine karşı çıkmak ve kendi solunumunuzu yapabilmeyi çabuklaştırmak amacıyla, PAVULON'un etkilerini ortadan kaldıran bir ilaç kullanılabilir.

PAVULON'u kullanmayı unutursanız

İlaç doktor ya da sağlık personeli tarafından uygulanacağından böyle bir olasılık söz konusu değildir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PAVULON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu yan etkiler anestezi sırasında gelişirse, anesteziistiniz veya uzman doktorunuz tarafından görülecek ve tedavi edilecektir.

Seyrek (Her 100 hastada 1'den az, her 10.000 hastada 1'den fazla) görülen yan etkiler:

- Kalp atım sayısının artması (taşikardi)
- Kan basıncının düşmesi (hipotansiyon)
- PAVULON'un etkisinin artması veya azalması
- PAVULON'un kas gevşetici etkisinin uzaması

Çok seyrek (Hastaların 10.000'de birinden az görülen) görülen yan etkiler:

- Alerjik (aşırı duyarlılığa bağlı) reaksiyonlar (örneğin solunum zorluğu, dolaşımın çökmesi ve şok)
- Hava yollarındaki kasların kasılması (bronkospazm) nedeniyle göğüste sıkışma hissedilmesi
- Derideki değişiklikler (örneğin ödem, kızarıklık, döküntü ya da kabarcıklar).
- Kaslarda güçsüzlük veya felç
- Durumları kritik olan hastalarda PAVULON ve kortikosteroidlerin (anti-enflamatuvar ilaçların) birlikte kullanılması sonucu gelişen, uzun süreli kas disfonksiyonu (steroid miyopatisi)
- Enjeksiyon yerinde ağrı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PAVULON'un saklanması

PAVULON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

PAVULON uygun saklama koşullarına göre (2-8°C'de karanlık yerde) hastanede saklanacaktır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PAVULON'u kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Ruhsat sahibi:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İSTANBUL

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç A.Ş
PK 262; 34361 Şişli-İstanbul
Telefon no: 212 534 79 00
Fax no: 212 521 04 66

Bu kullanma talimatı 08/12/2011 tarihinde onaylanmıştır.