

## KULLANMA TALİMATI

### ZALVOR™ % 5 Deri Kremi Haricen kullanılır.

**Etkin maddeler:** Her 1 g'ında; 50 mg permetrin içerir.

**Yardımcı maddeler:** Butil hidroksitoluen, formaldehit çözeltisi, Fraksiyonize hindistan cevizi yağı, Gliseril monohidrat, Gliserin, Makrogol(2)setileter, Setomakrogol 1000, İzopropil miristat, Amerkol L-101, Karbomer 934P, Sodyum hidroksit, Saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ZALVOR nedir ve ne için kullanılır?
2. ZALVOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ZALVOR nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ZALVOR' un saklanması

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ZALVOR nedir ve ne için kullanılır?**

ZALVOR, bit ve benzerlerine karşı etki gösterir ve bu hayvanları, sinir sistemlerini etkileyerek öldürür.

ZALVOR, 30 g'lık plastik burgulu kapaklı laminat tüpler halinde.

ZALVOR, uyuz tedavisi ve pubis biti enfestasyonlarında/bulaşmalarında kullanılır.

#### **2. ZALVOR' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**ZALVOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Piretroidler, piretrinler ve ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa

#### **ZALVOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- ZALVOR'un gözlerinizle temas etmemesine dikkat edin. Eğer gözünüze temas ederse gözünüzü bol suyla yıkayınız.
- Eğer ZALVOR'u yüzünüze sürecekseniz, göz çevresine yakın uygulamalarda dikkat ediniz.

- Eđer çocuđunuza uygulayacaksanız, ađız evresine srmemeye dikkat ediniz. ocuđunuz ilacı yalayabilir.
- Srekli uyguluyorsanız, ellerinizin tahriř olmaması iin eldiven kullanınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

ZALVOR'un gebelikte kullanımı ile ilgili bilgi kısıtlıdır. ZALVOR tedavisini takiben fets zerinde oluřturabileceđi zararlı etki ok azdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

ZALVOR'un insanlarda anne st iinde atılıp atılmadıđı bilinmemektedir. Ancak teorik olarak ok kk yzdesi anne stne geecektir. Bu kadar dřk miktarların yenidođan/bebek iin risk oluřturması beklenmez.

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Ara ve makine kullanımı**

ZALVOR'in ara ve makine kullanımı zerine etki etmesi olası deđildir.

### **ZALVOR'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

İeriđindeki btil hidroksitoluen ve formaldehit nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (rneđin, kontak dermatite) ya da gzlerde ve mukoz membranlarda tahriře sebebiyet verebilir.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

ZALVOR'un bilinen herhangi bir ila etkileřimi yoktur.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullanınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. ZALVOR nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

#### *Uyuz tedavisi*

Cilt tipi ve yzey alanında bireysel deđiřikliklerin farklılıđı gz nnde bulundurulduđunda doz konusunda kesin tavsiyeler yapılması mmkn deđildir.

*Eriřkinler ve 12 yařın zerindeki ocuklar:* Tek uygulamada yaklaşık 1 tpe kadar. Bazı eriřkinlerde tm vcudu kaplamak iin 30 g'lık 1 tpten fazlası gerekebilir de 2 tpten (60g) fazlası uygulanmamalıdır.

#### *Pubis biti tedavisi*

30 g'lık bir tbn 1/3', pubik blge, ans vresi, uyluk blgesi ve gvdeye uygulanması tavsiye edilir. Az bir eriřkin grubu tedaviyi tamamlamak iin daha fazla kreme ihtiya duyabilir, fakat 30 gramlık tpn 2/3'nden fazlası kullanılmamalıdır.

## Uygulama yolu ve metodu:

### *Uyuz Tedavisi*

1. Duş alındıktan sonra temiz ve serin vücuda baş dışında tüm vücut kaplanacak şekilde uygulanır.
2. Uygulamada özellikle el ve ayak parmakları arasında kalan alanlar, bilekler, koltuk altları, dış genital organlar, kaba etler, el ve ayak tırnaklarının altına dikkat edilmelidir.
3. 8-12 saat beklenir. Bekleme süresinde eller yıkanmışsa, ellere tekrar sürülmesine özen gösterilir.
4. Uygulama sonrasında duş alınır.
5. Temiz giysiler giyilir, yatak çarşafı ve giysiler sıcak su ile yıkanıp, sıcak ütü ile ütülür.

### *Uyuzdan Korunmanın Yolları*

1. Tüm aile kontrol edilmeli, bulaşması olası aile dışı arkadaş veya akrabalar uyarılmalıdır.
2. Tüm aile bireylerine uyuz tedavisi uygulanmalıdır.
3. Uyuz böceği eşyalar üzerinde 2-3 gün yaşayabildiği için, tüm eşyalar ve giysiler kaynar su ile 20 dakika süre ile yıkanmalı, tüm giysilerin (giyecekler, çarşaf, yastık kılıfları vs.) özellikle vücutla temas eden iç bölgeleri sıcak ütü ile ütülenmelidir.
4. Tüm ev ve araba elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.

*2 aylıktan 2 yaşa kadar çocuklarda ve yaşlılarda:* 2 yaşın üzerindeki çocuklar ve erişkinlerdeki uygulamaya benzerdir. Buna rağmen, bu hasta gruplarında, uyuz lezyonları yüz, boyun, saçlı deride ve kulaklara daha çok sıçramış olduğundan, ZALVOR'un bu bölgelere de sürülmesi etkilidir. Hastaların yaklaşık %90'ında uyuz enfestasyonu kremin tek bir uygulamasıyla giderilir. Eğer varolan lezyonlarda iyileşme belirtisi yoksa veya yeni lezyonlar oluşursa, ikinci bir uygulama 7 günden önce olmamak üzere yapılabilir.

### *Pubis biti tedavisi*

ZALVOR, pubik bölgeyi, anüs çevresini, uyluk bölgesinin iç tarafından dizlere kadar ve pubik bölgeye uzanan gövdedeki tüyleri kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. Kirpikler ve kaşlar hariç yüz tüylerinde de, bit ve sirke enfestasyonu bulunursa uygulanmalıdır. Kirpiklerde, bit ve sirke bulunursa, cımbız ile alınmalı, ZALVOR iritasyona neden olabileceği için gözlerde kullanılmamalıdır. Enfestasyon bir uygulama ile tamamen ortadan kaldırılabilir. Buna rağmen, uygulamadan 7 gün sonra uygulanan bölgede canlı bit görülürse, ikinci bir tedavi uygulanabilir.

## Değişik yaş grupları:

### • Çocuklarda kullanım:

#### *Uyuz tedavisi*

*12 yaşın altındaki çocuklar:* 30 gramlık bir tüp esas alınarak tek uygulamada kullanılacak yaklaşık krem miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

2 aylıktan 1 yaşa kadar çocuklar Bir tüpün 1/8'i kadar

1 ile 5 yaş arasındaki çocuklar Bir tüpün 1/4'ü kadar

6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar Bir tüpün 1/2'si kadar

Baş boyun saçlı deri ve kulakların da tedavisi gerektiği durumlarda, tüm vücudun kaplanması için doz artırılabilir.

#### *Pubis biti tedavisi*

Çocuklar ve nisbeten az tüylü kişilerde oransal olarak daha az krem kullanılmalıdır.

- **Yaşlılarda kullanımı:** 70 yaş üzerindeki hastalar doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

### **Özel kullanım durumları:**

- **Böbrek ve karaciğer yetmezliği:** Veri yoktur.

*Eğer ZALVOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşun.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ZALVOR kullandıysanız:**

ZALVOR'un aşırı uygulanması bölgesel yan etkiler veya daha ciddi deri reaksiyonları ihtimali taşır.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğünde belirtilere yönelik tedavi yapılır. Eğer çocuğunuz kazara ZALVOR içeriğini yutarsa, yutulmayı takiben 2 saat içinde hekime başvuru durumlarında midenin yıkanması uygundur.

*ZALVOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **ZALVOR'u kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **ZALVOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuzun size söylediği süre zarfında kullanın.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, ZALVOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

### **Bilinmiyor**

- Ağrı
- Yanma veya batma hissi şeklinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritem, ödem, egzama, kızarıklık ve kaşıntı
- Hissizlik

*Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildirin.*

### **5. ZALVOR'un Saklanması**

*ZALVOR'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZALVOR'u kullanmayınız.*

*Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ZALVOR'u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.*

**Ruhsat sahibi:** GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.  
Büyükdere Cad. No.173, 1.Levent Plaza  
B Blok 34394 1.Levent/İstanbul

**Üretim Yeri:** Glaxo Wellcome Operations, İngiltere.

*Bu kullanma talimatı .././.... tarihinde onaylanmıştır.*