

## KULLANMA TALİMATI

### OMNISCAN 0,5mmol/ml IV Enjeksiyon için çözelti içeren flakon

Damar yoluyla enjeksiyon şeklinde kullanılır.

- **Etkin Madde:**Gadodiamid (287 mg gadodiamid/ml, 0.5mmol/ml'ye eşdeğerdir)  
10 ml içeriği: 2.87 g (5.0mmol) Gadodiamid  
15 ml içeriği: 4.31 g (7.5mmol) Gadodiamid  
20 ml içeriği: 5.74 g (10.0mmol) Gadodiamid
- **Yardımcı maddeler:**1 ml.de sodyum kalsiyum 12.0 mg, yeterli miktarda sodyum hidroksit çözeltisi veya hidroklorik asit ve yeterli miktarda enjeksiyonluk su bulunur.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak için reçete edilmiştir. başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu kullanma talimatında:**

1. **OMNISCAN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **OMNISCAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **OMNISCAN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **OMNISCAN'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. OMNISCAN nedir ve ne için kullanılır?**

OMNISCAN, IV enjeksiyon için çözeltidir. Ürün şeffaf, renksizden açık sarıya değişen, sulu bir çözeltidir ve 1x10ml, 1x15ml ve 1x20ml'lik ambalajlarda piyasaya sunulur. Ürün cam şişe içinde klorobutil kauçuk (lateks içermeyen) tıpa ile kapatılmıştır.

Bu ilaç sadece tani içindir.

OMNISCAN, beyin veya omurganın, ayrıca, tüm vücudun (baş ve boyun bölgesi, kalp dahil toraks boşluğu, kollar ve bacaklar, karın boşluğundaki prostat, mesane, pankreas ve karaciğer organları, böbrekler, kadınlarda meme, kas-iskelet sistemi ve kan damarları gibi) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tekniği ile tetkiki için kullanılan bir üründür.

OMNISCAN bazı tıbbi durumların daha açık şekilde görülmesine yardımcı olabilir. Bu doktorun bu durumları daha kolay anlamasına ve incelemesine yardımcı olur. Böylece tanı koymak için daha fazla bilgi sağlanabilir.

## 2. OMNISCAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### İNTRATEKAL KULLANIMI YOKTUR.

İntratekal kullanımı konvülsiyon, koma, duyuusal ve motor sinir hasarı oluşturmuştur.

### OMNISCAN 'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Gadodiamid veya OMNISCAN formülündeki diğer herhangi bir bileşene (Bkz. Yukarıda "*Yardımcı maddeler*") karşı alerjik iseniz.
- Eğer şiddetli ve/veya akut böbrek hasarınız varsa veya karaciğer nakli olmak üzere iseniz veya yakın geçmişte size karaciğer nakli yapıldıysa.

OMNISCAN'ın yukarıdaki koşulları taşıyan hastalarda kullanımı, Nefrojenik Sistemik Fibrozis (NSF) denilen bir hastalıkla ilişkili bulunmuştur. NSF, deride ve bağ dokuda kalınlaşma ile görülen bir hastalıktır. NSF eklem hareketlerinde bozulma, kas güçsüzlüğü veya iç organların işlevlerinde, hayati tehlike oluşturabilecek, bozulmalara neden olabilir.

- 4 haftalığa kadar olan yenidoğan bebeklerde kullanılmamalıdır.

### OMNISCAN 'ı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Vücudunuzda kalp pili veya demir içeren bir implantınız varsa
- Daha önce kontrast madde aldıktan sonra şiddetli bir reaksiyonla karşılaştıysanız
- Alerji (örn. deniz ürünlerine alerji, saman nezlesi, ürtiker), astım veya diğer alerjik solunum sorunlarınız varsa ya da bu sorunları daha önce yaşadysanız.
- Kalp hastalıkları veya merkezi sinir sistemi ile ilgili (sara veya beyinde sorunlar gibi) sorunlarınız varsa
- Orta derecede böbrek problemlerinizi varsa.

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

Aşağıdakiler sizin için geçerli ise doktorunuza söyleyiniz:

- Böbreklerin iyi çalışmıyorsa
- Yakın geçmişte veya yakın gelecekte bir karaciğer nakli sizin için söz konusu ise.

OMNISCAN size uygulanmadan önce, böbreklerinizin iyi çalışıp çalışmadığını anlamak üzere kan testlerinizin yapılması gerekir.

OMNISCAN 4 haftalığa kadar olan yenidoğanlarda kullanılmamalıdır. 1 yaşına kadar olan bebeklerde böbrek işlevleri gelişmediğinden, OMNISCAN, bu yaş grubunda, ancak doktorun dikkatli bir şekilde yapacağı değerlendirmeye uygun bulması halinde kullanılabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

## **OMNISCAN'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Bu konuda doktorunuzun nerilerini izleyiniz.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Kesinlikle gerekli olmadıka hamilelik sırasında OMNISCAN kullanılmamalıdır. Hamile iseniz veya hamile olabileceđinizi dřünüyorsanız OMNISCAN kullanmadan nce bunu doktorunuza syleyiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz veya hamile olabileceđinizi dřünüyorsanız hemen doktorunuza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emziren bir anne iseniz veya emzirmeye bařlamak zereyseniz bunu doktorunuza syleyiniz. İlacın verilmesinden nce meme vermeye ara veriniz ve OMNISCAN'ın verilmesinden en az 24 saat sonrasına kadar yeniden meme vermeyiniz.

### **Ara ve makine kullanımı:**

Grntleme iřleminden sonra mide bulantısı meydana gelebileceđinden, araba kullanmayınız.

### **OMNISCAN'ın ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

Bu ila, 0.62 mg/ml sodyum ierir. Bu durum, kontroll sodyum diyetinde olanlar iin gz nnde bulundurulmalıdır.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

OMNISCAN enjeksiyonu ile aynı gn veya enjeksiyon sonrasındaki 12- 24 saat iinde kan numunesi verecekseniz bunu doktorunuza bildiriniz. OMNISCAN, kandaki elektrolitlerin (rn. demir ve kalsiyum) llmesi iin yaygın olarak kullanılan bazı yntemlerle etkileřir.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınsa ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. OMNISCAN nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

Enjekte edilen miktar, kilonuza ve vcudunuzun hangi blmnn nceleneceđine gre deđiřir. Normal doz 0.2 ml/kg vcut ađırlıđı veya bazen 0.6 ml/kg vcut ađırlıđına kadardır. 100 kg'dan daha ađır olsanız bile, normal kořullarda, 20 ml'den ve bazı durumlarda 60 ml'den fazla doz almanız sz konusu olmayacaktır.

### **zel hasta gruplarında doz belirlenmesi:**

Eđer ađır bbrek rahatsızlıđınız ve/veya akut bbrek hasarınız varsa veya karaciđer nakli olan veya karaciđer nakli olmak zere bir hasta iseniz, size OMNISCAN uygulanmamalıdır. OMNISCAN, 4 haftalıktan daha ktk bebeklere de uygulanmamalıdır.

Orta derecede böbrek sorunlarınız varsa, size tetkik sırasında, sadece bir doz OMNISCAN uygulanmalıdır. Bu durumda, eğer gerekiyorsa, size ikinci bir enjeksiyon en az 7 gün sonra yapılabilir.

1 yaşına kadar olan bebeklerde böbrek işlevleri tam olarak olgunlaşmamıştır. Bu nedenle bu yaş grubundaki bebeklere sadece tek doz OMNISCAN enjekte edilmelidir. İkinci bir enjeksiyon gerekiyorsa, ilk enjeksiyondan sonra en az 7 gün geçmiş olmalıdır.

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

65 yaşında veya daha yaşlı bir hasta iseniz, dozunuzda ayarlama yapılması gerekmez, ancak, böbreklerinizin iyi çalışıp çalışmadığını anlamak için size bir kan testi yapılacaktır.

**Uygulama yolu ve metodu:**

OMNISCAN MR tetkiki öncesinde veya sırasında, genellikle tek bir enjeksiyon şeklinde toplar damarlarınızdan birinin içine uygulanacaktır. Ek teşhis bilgilerine ulaşmak için bazen ikinci bir enjeksiyonun daha uygulanması gerekebilir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız

**Kullanmanız gerekenden daha fazla OMNISCAN kullandıysanız**

Bu ilaç doktor kontrolünde ve klinikte uygulanacaktır.

**OMNISCAN’i kullanmayı unutursanız**

OMNISCAN uygulamasının ne zaman yapılacağı konusunda doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Bu ilaç size doktor kontrolünde, bir klinikte uygulanacaktır.

**OMNISCAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Size OMNISCAN uygulandıktan sonra herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

**4. Olası yan etkiler nelerdir ?**

Tüm ilaçlar için olduğu gibi, OMNISCAN da yan etkilere neden olabilir, ancak bu yan etkiler tüm hastalarda ortaya çıkmaz.

**Aşağıdaki seyrek görülen semptomlar ciddi olabilir. Eğer bunlardan herhangi birini farkederseniz DERHAL doktorunuza bildiriniz**

- Aşağıdakileri de içine alan anjiyoödem belirtileri:
  - Yüzde, dilde veya boğazda şişlik
  - Yutma güçlüğü
  - Kurdeşen, nefes almakta güçlük
- Aşağıdakileri de içine alan nefrojenik sistemik fibrozis belirtileri:
  - Ciltte kalınlaşma
  - Eklemlerde şiddetli bir hareket edememe durumu
  - Kaslarda zayıflık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

**Aşağıdaki istenmeyen etkiler, tetkik sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir:**

**Yaygın** (10 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir):

- Hassasiyet ve sıcaklık şeklinde geçici rahatsızlık
- Enjeksiyona bağlı soğuk veya lokal basınç hissi
- Enjeksiyon yerinde geçici ağrı hissi
- Baş ağrısı
- Bulantı

**Yaygın olmayan** (100 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir):

- Alerji benzeri cilt ve muköz membran etkileri
- Aşırı duyarlılık
- Baş dönmesi
- Karıncalanma duyusu
- Tat duyusunda geçici değişiklik
- Kusma
- İshal
- Yüz bölgesinde ani kızarma (al basması)
- Kaşıntı

**Seyrek** (1000 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir):

- Koku duyusunda geçici değişiklik
- Kramplar
- Uykulu dalgınlık hali
- Solunum güçlüğü
- Eklemlerde ağrı
- Bazı kaslarda sarsıntılı kasılmalar
- Anksiyete (kaygı)
- Görme bozuklukları
- Göğüs ağrısı
- Akut böbrek yetmezliği
- Öksürük
- Döküntü ve kurdeşen
- Yüzde şişme dahil şişlikler
- Ateş
- Titreme

**Sıklığı bilinmeyen** (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen):

- Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar
- Hızlı nabız.
- Hapşırma.
- Boğazda irritasyon
- Şiddetli solunum güçlüğü.

Alerjik reaksiyonların çoğunluğu enjeksiyondan sonraki yarım saat içinde ortaya çıkar. Seyrek olarak yan etkiler saatler veya günler sonra ortaya çıkabilir.

*Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorumuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması:**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. OMNISCAN'ın saklanması**

OMNISCAN'ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Etiketeki son kullanma tarihinden sonra OMNISCAN'ı kullanmayınız.*

Flakonu ışıktan korumak için dış kartonu içinde saklayınız.

Dondurmayınız.

Renk değişikliği veya partikül bulunan veya ambalajında bozukluk olan ürünleri kullanmayınız.

Flakon üzerindeki soyulabilir izleme etiketi mutlaka hastanın dosyasına yapıştırılmalı, böylece kullanılan gadolinyum doğru şekilde kayıtlara geçirilmelidir. Kullanılan doz da kaydedilmelidir.

Açıldıktan sonraki kimyasal ve fiziksel stabilite 25<sup>0</sup>C'de 8 saat için gösterilmiştir. Mikrobiyolojik açıdan, ürün açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Aksi uygulamalarda sorumluluk, ilacı uygulayana aittir.

***Ruhsat Sahibi:***

OPAKİM Tıbbi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.  
Tophanelioğlucad. No. 70/1A  
Altunizade34662 – İstanbul  
Tel.:0216 326 70 42  
Faks: 0216 340 16 89

***Üretici:***

GE Healthcare Ireland  
IDA Business Park  
Carrigtohill  
Co. Cork - İrlanda

*Bu kullanma talimatının onay tarihi:*

## AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK OLAN SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Her flakondaki kontrast madde tek kullanım içindir. Kullanılmayan kısımlar imha edilmelidir.

Eğer bu ilaç otomatik uygulama sistemi ile kullanılmak için tasarlanmışsa, bu kullanım için uygunluğu tıbbi cihazın üreticisi tarafından kanıtlanmış olmalıdır. Tıbbi cihazın kullanım talimatlarına sıkı sıkıya uyulmalıdır.

**OMNISCAN uygulanması düşünülen tüm hastalar, uygulamadan önce, gerekli laboratuvar tetkikleri yapılarak renal fonksiyon bozukluğu açısından değerlendirilmelidir.**

Akut veya kronik şiddetli böbrek yetmezliği (GFR<30 ml/dk/1.73 m<sup>2</sup>) ve/veya akut böbrek hasarı olan hastalarda, OMNISCAN veya diğer bazı gadolinyum içeren kontrast maddelerin kullanımı ile ilişkili bulunan nefrojenik sistemik fibroz (NSF) vakaları bildirilmiştir. Akut renal yetmezlik insidansının yüksek olduğu karaciğer transplantasyonu sürecindeki hastalar özellikle risk altındadır. Bu nedenle OMNISCAN, perioperatif karaciğer transplantasyonu dönemindeki hastalarda kullanılmamalıdır.

OMNISCAN, 4 haftalığa kadar olan yenidoğan bebeklerde de kullanılmamalıdır.

Orta derecede renal yetmezliği olan hastalarda (GFR 30-59 ml/dk/1.73 m<sup>2</sup>) NSF gelişme riski bilinmemektedir. Bu hastalarda OMNISCAN çok dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır. Bu hastalarda doz, 0.1mmol/kg vücut ağırlığını geçmemelidir. Bir taramada bir dozdan fazlası kullanılmamalıdır. Tekrarlanan uygulamalarla ilgili bilgi yetersiz olduğundan, OMNISCAN enjeksiyonları aradan en az 7 gün geçmedikçe tekrarlanmamalıdır.

1 yaşına kadar olan bebeklerde renal fonksiyonların gelişmemiş olması nedeniyle, bu hastalarda OMNISCAN, sadece dikkatli bir değerlendirmeden sonra ve 0.1mmol/kg vücut ağırlığı dozunu geçmeyecek şekilde kullanılmalıdır. Bir taramada bir dozdan fazlası kullanılmamalıdır. Tekrarlanan uygulamalarla ilgili bilgi yetersiz olduğundan, OMNISCAN enjeksiyonu, aradan en az 7 gün geçmedikçe tekrarlanmamalıdır.

OMNISCAN 4 haftalığa kadar yenidoğan bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda, gadodiamidin renal klerensi azalmış olabileceği için, 65 yaş ve üzerindeki hastalarda renal fonksiyon bozukluğu açısından tarama yapılması özellikle önemlidir.

OMNISCAN uygulamasından sonra kısa süre içinde yapılacak hemodiyaliz, ilacın vücuttan uzaklaştırılması için yararlı olabilir. Halen hemodiyaliz sürecinde olmayan hastalarda NSF'nin önlenmesi veya tedavisi için hemodiyalize başlanmasını destekleyen herhangi bir kanıt yoktur.

OMNISCAN, gebelik sırasında, kadının klinik durumu gadodiamid kullanımını zorunlu kılmıyorsa, kullanılmamalıdır.

OMNISCAN kullanımından sonra emzirmeye en az 24 saat ara verilmelidir.

Flakon üzerindeki soyulabilir izleme etiketi mutlaka hastanın dosyasına yapıştırılmalı, böylece kullanılan gadolinyum kontrast maddesinin ne olduğu doğru şekilde kayıtlara geçirilmelidir. Uygulanan doz da kaydedilmelidir.