

KULLANMA TALİMATI

Bu tıbbi ürünü almaya başlamadan önce bu kullanma talimatı'nın tümünü dikkatlice okuyunuz.

- Bu kullanma talimatını muhafaza ediniz. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Eğer başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Bu kullanma talimatının tümünü dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu tıbbi ürün reçetesiz satılmaktadır. Bununla birlikte, ondan en iyi sonucu elde etmek için HARPAGO'yu yine de dikkatlice kullanmanız gerekir.

- Bu kullanma talimatını muhafaza ediniz. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Eğer daha fazla bilgi veya tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Eğer kullanım süresince semptomlarınız kötüleşir ya da düzelmezse bir doktora görünmelisiniz.

Bu kullanma talimatında:

- 1.HARPAGO nedir ve ne için kullanılır?*
- 2.HARPAGO'yu kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
- 3.HARPAGO nasıl kullanılır?*
- 4.Olası yan etkiler nelerdir?*
- 5.HARPAGO'nun saklanması*
- 6.Diğer bilgiler*

Başlıkları yer almaktadır.

HARPAGO 600 mg Film Tablet

Ağız yolu ile alınır.

- ***Etkin madde:*** Bir film tablet 600 mg standardize edilmiş *Harpagophytum procumbens* D.C. (Devil's Claw) kökünün kuru ekstresini içerir.

- **Yardımcı maddeler:** Cellactose (%75 Laktoz monohidrat ve %25 Selüloz), Sodyum nişasta glikolat, Kolloidal Anhidr silika, Magnezyum stearat, Opadry II 85F 18422 White (Polivinil alkol GL-05FS, Titanyum Dioksit, PEG, Toz EEP, Talk).
- **Ruhsat Sahibi:** DrogSan İlaçları San. Ve Tic. A.Ş.
- **Üretici:** DrogSan İlaçları San. Ve Tic. A.Ş.

1. HARPAGO nedir ve ne için kullanılır ?

HARPAGO 600 mg Film Tabletlerin her biri 600mg standardize edilmiş *Harpagophytum procumbens* D.C. (Devil's Claw) kökünün kuru ekstresini içerir.

HARPAGO, 30 ve 60 adet film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Harpagophytum procumbens D.C. (Devil's Claw) kuru ekstresi ve iridoit glikoziti harpagosit içeren HARPAGO 600mg Film Tablet, antienflamatuar, analjezik ve antioksidan etkilidir. Bel ağrısının giderilmesine, ağrılı osteoartrit semptomatik tedavisine, kas ve eklemlerdeki ağrıların giderilmesine, genel ağrıların giderilmesine, romatizma kaynaklı ya da kas ağrıların giderilmesine, dispepsi tedavisine yardımcı olarak ve iştah açıcı olarak kullanılır.

2. HARPAGO'yu kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

HARPAGO'nun bebeklere, çocuklara veya yetişkinlere yönelik olduğuna dair bilgi aşağıda verilmiştir;

Pediyatrik popülasyon: 18 yaşın altındaki çocuklarda etkililik ve güvenliliğine ilişkin kısıtlı veri bulunması nedeniyle, 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez.

Geriatrik popülasyon: Yaşlılar için doktor kontrolünde kullanmaları önerilir.

Aşağıdaki durumlarda HARPAGO'yu kullanmayınız:

Eğer;

- Harpagophytum procumbens'e veya HARPAGO'nun herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız,
- Mide ülseri ya da duodenal ülseriniz varsa,
- Laktoza karşı intoleransınız varsa,

- Hamileyseniz veya emziriyorsanız,
- Ürün içeriğindeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa,
- 18 yaşın altındaysanız.

Aşağıdaki durumlarda HARPAGO'yu dikkatli kullanınız:

Eğer,

- Bazı şekerlere karşı intoleransınız varsa,
- Eklemde şişme, kızarıklık ya da ateş ile beraber eklem ağrınız varsa,

bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HARPAGO'nun etkisine tesir edebilecek besinlerle ve içeceklerle birlikte kullanılması:

Yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılmasıyla ilgili bir veri bulunmamaktadır.

Gebelik:

Bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

Bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanma:

Araç ve makine kullanmayınız çünkü bazı hastalarda baş dönmesi ve uyuklamaya neden olabilir.

Herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

HARPAGO'nun bazı bileşenleri hakkında önemli bilgiler:

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

HARPAGO ile birlikte dięer tıbbi ürünleri kullanmak

Bu ilacın dięer ilaçlarla etkileşimi ile ilgili bir veri bulunmamaktadır.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. HARPAGO nasıl kullanılmalı

HARPAGO'yu kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmedięi takdirde:

Bel ağrısının giderilmesine, ağrılı osteoartritin semptomatik tedavisine ve dispepsi tedavisine yardımcı olarak günde 3 defa 1-2 tablet; iřtah açıcı olarak günde 3 defa 1 tablet kullanılır.

Kas ve eklemlerdeki ağrıların giderilmesine, genel ağrıların giderilmesine, romatizma kaynaklı ya da kas ağrılarının giderilmesine yardımcı olarak günde her sabah ve her akřam olmak üzere 1 tablet kullanılır.

Eđer HARPAGO'nun etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduęu izlenimine sahipseniz, doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

Deęişik yař grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yařlılarda kullanımı:

65 yař üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/karaciğer yetmezliği:**

Geçerli değildir.

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla HARPAGO kullanırsanız:

HARPAGO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer HARPAGO'yu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları tamamlamak için çift doz almayınız.

HARPAGO ile tedavi kesildiğinde görülen etkiler:

HARPAGO kullanımının sonlandırılması ile ilgili bir olumsuzluk beklenmez. Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.

4. Olası Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, HARPAGO'nun da yan etkileri olabilir.

Çok seyrek (10,000 hastanın 1'den az görülebilir)

- Bulantı ya da kusma hissi
- Kusma
- Diyare
- Karın ağrısı
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, kırmızı kaşıntılı deri)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bildiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) 'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. HARPAGO'nun Saklanması

HARPAGO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında kuru bir yerde saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HARPAGO'yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HARPAGO'yu kullanmayınız.

6. Diğer bilgiler

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3

Balgat-ANKARA

Tel: 00 90 312 287 74 10

Faks: 00 90 312 287 61 15

e-mail: www.drogsan.com.tr

Üretim Yeri:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Çubuk Cad. No:31

06760 Çubuk - ANKARA

7. Bu Kullanma Talimatının Son Onay (Tarihi)

Bu kullanma talimatı 12/06/2017 tarihinde onaylanmıştır.

8. HARPAGO'nun sadece eczanelerde satılacağına dair uyarı

SADECE ECZANELERDE SATILIR.