

KULLANMA TALİMATI

TARUDİN 10 mg tablet
Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 10 mg rupatadin (fumarat şeklinde).
- **Yardımcı maddeler:** Prejelatiniza nişasta, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, kırmızı demir oksit (E172), sarı demir oksit (E172), koloidal silikon dioksit, stearik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **TARUDİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TARUDİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TARUDİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TARUDİN'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. TARUDİN nedir ve ne için kullanılır?

TARUDİN kutu içerisinde 10 mg'lık 20 tane tablet halinde sunulan anti-alerjik bir ilaçtır.

TARUDİN etkin madde olarak rupatadin fumarat içerir.

TARUDİN 12 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel (aralıklı/intermitan) veya yıl boyu süren (sürekli/persistan) alerjik rinitin hapsırma, burun akıntısı, göz ve burun kaşınması gibi belirtilerini giderir. TARUDİN ayrıca ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi ürtikere (alerjik bir deri döküntüsü) bağlı semptomların giderilmesinde de kullanılır.

2. TARUDİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TARUDİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer, TARUDİN'in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
- 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

TARUDİN'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer;

- Kalp rahatsızlıęınız varsa,
- Kanda potasyum dūřüklüęü varsa ve kalp atım hızınız anlamlı řekilde yavařsa,
- Ergenlik döneminde iseniz,
- Bazı kalıtsal metabolik hastalıklarınız varsa (bazı řekerlere karřı tahammülsüzlüęünüz varsa),
- 65 yařından daha yařlıysanız,
- Karacięer ve böbrek fonksiyonlarınız yetersiz ise dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geęmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geęerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

TARUDİN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Greyfurt suyu ile birlikte kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Gebelikte doktorunuza danıřmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

TARUDİN'in anne sütüne geip gemedięi bilinmedięinden doktorunuza danıřmadan kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

Araba ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

TARUDİN'in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İerięinde bulunan laktoz nedeniyle eęer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız (tahammülsüzlüęünüz) olduęu söylenmiřse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

TARUDİN'in herhangi bir ilala ciddi bir etkileřiminin bulunduęuna dair kanıt yoktur. Ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılan bir ila), eritromisin (antibiyotik) ve greyfurt suyu ile birlikte TARUDİN'i kullanmayınız.

Rupatadin ile birlikte statin (kolesterol dūřürücü ila gruplarına verilen genel isim) veya alkol alıyorsanız ilacınızı dikkatli kullanınız.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TARUDİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen dozu günde bir defa 1 tablet (10 mg) şeklindedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir.

Ağızdan bir miktar su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın altında kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

TARUDİN yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Klinik deneyim olmadığından, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Eğer TARUDİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TARUDİN kullandıysanız:

TARUDİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TARUDİN'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TARUDİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TARUDİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TARUDİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TARUDİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Huzursuzluk
- Burun kanaması
- Üst ve alt karın ağrısı
- Bulantı, kusma
- Kas, bel veya eklem ağrıları

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Sersemlik
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Yorgunluk, halsizlik
- Dikkat bozukluğu
- Yüksek ateş veya boğaz ağrısı
- İştah artışı
- Ağız, boğaz veya burun kuruluğu
- İshal veya kabızlık
- Midede rahatsızlık veya göğüste yanma hissi
- Deride kızarıklık

Bunlar TARUDİN'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TARUDİN'in saklanması

TARUDİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TARUDİN'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TARUDİN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1
34349 Gayrettepe, İstanbul
Tel: 0212 337 38 00

Üretim Yeri: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Sanayi Cad. No:13
Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Bu kullanma talimatı 07/03/2016 tarihinde onaylanmıştır.