

KULLANMA TALİMATI

REGEN-D 150 mcg jel

Deri üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 15 gramlık tüp içerisinde etkin madde olarak; 150 mcg/g konsantrasyonunda, rekombinant DNA teknolojisiyle üretilen rekombinant insan epidermal büyüme faktörü artırılmış bulku yer alır.
- **Yardımcı maddeler:** Karbopol ultrez, mannitol (E421), l-lizin hidroklorür, gliserol, trietanolamin (pH ayarlayıcısı), sodyum metil paraben, sodyum propil paraben.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. REGEN-D 150 nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. REGEN-D 150 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. REGEN-D 150 nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. REGEN-D 150'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. REGEN-D 150 nedir ve niin kullanılır?

REGEN-D 150, beyaz kapaklı, 15 gramlık baskılı lami t pler ierisinde, etkin madde olarak rekombinant DNA teknolojiyle  retilmiř rekombinant insan epidermal b y me fakt r  arıtılmıř bulku ierir. Her kutuda 1 veya 9 adet jel ieren t p bulunur.

REGEN-D 150, berrak, renksiz, deriden geebilen, ierik daėılımı aynı, yarı katı ve sadece deri  zerine uygulanır.

Rekombinant insan epidermal b y me fakt r , h crelerin oėalmasında ve yenilenmesinde  nemli rol oynayan b y me fakt r d r. Protein yapısında olup, normal h cre geliřimini artırır veya yaraların ( lserlerin) iyileřmesini hızlandırır.

REGEN-D 150, řeker hastalıėı sonucu ayaklarda geliřen yaraların (ayak  lseri) tedavisinde kullanılır.

REGEN-D 150 ile tedavinizin s resi en fazla 8-12 hafta s rmelidir; tedavi s resi iin doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

2. REGEN-D 150'yi kullanmadan  nce dikkat edilmesi gerekenler

REGEN-D 150'yi ařaėıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eėer;

- Sizde melanom ve non-melanom (melanom ve melanom dıřı) deri kanseri ř phesi ya da  yk s  var ise,
- Kanser  yk n z var ise,
- Size radyoterapi veya kemoterapi uygulanıyorsa,
- Hamileyseniz,
- Emziriyorsanız,
- Karaciėer ve b brek yetmezliėiniz (kreatinin > 3 mg/dl) var ise,
- Aktif t berk loz (verem) hastası iseniz,
- Yara b lgesinde debride edilmemiř gangren ( l  dokulardan temizlenmemiř gangren), nekroz (doku  l m ), p r lan doku ve sin s oluřumu (iltihaplı doku ve oyuk oluřumu), tedavisi bitmemiř osteomyelit (kemik iliėi iltihabı) var ise,
- Baėıřıklık sisteminde bozukluk veya yetersizlik varsa,
- Baėıřıklık sistemini uyarıcı veya baėıřıklık sistemi baskılayıcı ilalar kullanıyorsanız,
- REGEN-D 150 ve bileřimindeki diėer maddelere, ařırı hassasiyetiniz varsa.

Bu durumları REGEN-D 150'yi kullanmadan  nce doktorunuza bildiriniz.

REGEN-D 150'yi ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- REGEN-D 150'yi diđer bŸyŸme faktŸrŸ ieren ilalarla birlikte kullanmayınız.
- REGEN-D 150 ile tedavi en fazla 8-12 hafta sŸrmelidir.
- REGEN-D 150'yi enfekte (iltihaplı) bŸlgelere uygulamayınız. Tedaviye bařlamadan Ÿnce iltihabın uygun bir biimde tedavi edilmesi gerekir.
- REGEN-D 150, erken dŸnem deri kanserlerinin hızla bŸyŸmesine neden olabileceđi ve bu tŸr kanserlerin kontrolŸnŸ zorlařtırabileceđi iin, uygulanmadan Ÿnce deri kanseri bulgusunun olmadıđını dođrulamak Ÿzere muayene edilmeniz gerekir.
- REGEN-D 150, kronik Ÿlserler Ÿzerinde geliřebileceđi skŸamŸz hŸcreli karsinomların (bir kanser eřidi) ilerlemesini kolaylařtırabilir.

REGEN-D 150'nin yiyecek ve iecek ile kullanılması

REGEN-D 150 deri Ÿzerine uygulandıđından, yiyecek ve ieceklerle beraber kullanımına iliřkin yan etkiler beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan Ÿnce doktorunuza ve eczacınıza danıřınız.

Hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan Ÿnce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

REGEN-D 150'nin anne sŸtŸne geip gemediđi bilinmemektedir.

Bu nedenle, REGEN-D 150 tedavisi sŸresince emzirilmemelidir.

Ara ve makine kullanımı

REGEN-D 150 deri Ÿzerine uygulandıđından, ara ve makine kullanım yeteneđi Ÿzerine etkisi beklenmez.

REGEN-D 150'nin ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Ÿnemli bilgiler

REGEN-D 150'nin bileřiminde yer alan diđer maddelere ařırı duyarlılıđınız mevcut deđilse, herhangi bir yan etki beklenmez.

REGEN-D 150 sodyum, mannitol ve gliserol ihtiva eder. Ancak, kullanım yolu nedeniyle

uyarı gerekmemektedir.

REGEN-D 150'nin içeriğinde bulunan sodyum metil paraben ve sodyum propil paraben, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı

REGEN-D 150, başka ilaçlarla birlikte kullanılmasında sakınca yoktur fakat diğer büyüme faktörü içeren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. REGEN-D 150 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler:

REGEN-D 150 dozu, yaranın büyüklüğüne göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Yara bölgesinin temizlenmesi sonrası, yara alanının tümünü kapsayacak şekilde, günde iki defa, ince bir tabaka halinde, steril pamuklu çubuk yardımıyla eşit bir şekilde sürülür (topikal uygulama).

Her bir tüp, her bir hastanın kullanımı içindir.

Yara alanıyla direk temastan kaçınmak için gerekli önlemleri alınız.

İlacı uygulamadan önce, yara alanının temiz olduğundan emin olunuz. Bunu; her gün yara alanını hafif bir sabun veya tuzlu suyla yıkayarak ve yara alanını temiz, kuru sargı ile sararak yapabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

REGEN-D 150, çocuklarda doktor tarafından belirlenen dozlarda uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

REGEN-D 150, yaşlılarda doktor tarafından belirlenen dozlarda kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

REGEN-D 150, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişilerdeki kullanılacak dozu doktorunuz belirleyecektir.

Eğer REGEN-D 150'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla REGEN-D 150 kullandıysanız:

REGEN-D 150'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REGEN-D 150'yi kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz bir sonraki dozu ne zaman alacağınızı size bildirecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REGEN-D 150 ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

REGEN-D 150 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etki bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, REGEN-D 150'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın :10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :1,000 hastanın birinden az fakat 10,000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek :10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

- Deri tahrişi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. REGEN-D 150'nin saklanması

REGEN-D 150'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

REGEN-D 150'yi, 2-8°C arası sıcaklıklarda (buzdolabında) saklayınız ve orijinal ambalajı içinde muhafaza ediniz.

Dondurmayınız. Serin ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanım tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanım tarihinden sonra REGEN-D 150'yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AŞ.

Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok. No:3, D:2-3, 06520

Çankaya/ANKARA

Tel: + 90 (312) 219 62 19

Faks: + 90 (312) 219 60 10

Web: www.genilac.com.tr

Üretim yeri: Bharat Biotech International Limited,

Genome Valley, Shameerpet Mandal, Ranga Reddy District - 500 078,

Telangana, Hindistan.

Bu kullanma talimatı .././.... tarihinde onaylanmıştır.