

KULLANMA TALİMATI

ZİNTİON Süspansiyon

Saç derisine uygulanır.

- **Etkin madde:** Her şişe 4,2 g zink piriton (%2) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Magnezyum alüminyum silikat, hidroksi propil metil selüloz, kokonut asit monoetanolamid, trietanolamin lauril sülfat, defne yağı, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **ZİNTİON nedir ve ne için kullanılır?**
 2. **ZİNTİON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
 3. **ZİNTİON nasıl kullanılır?**
 4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
 5. **ZİNTİON'un saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

1. ZİNTİON nedir ve ne için kullanılır?

ZİNTİON, saç derisindeki kepek veya seborenin (yağlanma, kabuklanma veya soyulma) sebep olduğu kaşıntı, pullanma, kepeklenmenin tedavisi ve önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Zink (çinko) piriton antiseboreik etkilidir. Hücre çoğalmasını yavaşlatarak etki eder ve bu sayede kepek oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

2. ZİNTİON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuz tarafından verilen tüm talimatları dikkatle uygulayınız. Bu talimatlar bu kullanma talimatında yer alan bilgilerden farklı olabilir.

ZİNTİON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

- Zink piriton veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİNTİON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Bazı tıbbi durumlar zink pirition süspansiyonu ile ters etkileşim yapabilir. Eğer herhangi bir tıbbi durumunuz veya hastalığınız varsa ve özellikle aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, doktor veya eczacınıza bilgi verin.

Eğer:

- Hamileyseniz, hamile olmayı planlıyor veya emziriyorsanız,
- Herhangi reçeteli veya reçetesiz bir ilaç, tıbbi destek veya beslenme desteği alıyorsanız,
- İlaç, besin ya da diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
- Vücudunuzun büyük bir bölümünü kaplayan bir rahatsızlığınız varsa.

Gözle temas ettirilmemelidir. Gözünüze, burnunuza veya ağızınıza gelmemesine dikkat ediniz. Kazayla gözle temas olmuşsa bol su ile yıkanmalıdır.

İki yaşın altındaki çocuklarda doktor tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Saç bakımı ile ilgili olarak kullanılan çeşitli şampuanlar, saç kremleri ve saç boyaları gibi saçlı derinin zedelenmesine yol açan her türlü etkenin sebep olduğu saç dökülmesi hallerinde ZİNTİON'un tedavi edici amaçla kullanılması bu etkenlerin sebep olduğu saç dökülmesini önlemez.

Oluşan tüm etkileşimler burada verilmemiş olabilir. Bundan dolayı doktorunuza veya sağlık görevlisine ZİNTİON'un kullandığınız herhangi bir ilaç ile etkileşime girip girmediğini sorunuz.

Kullandığınız ilaca başlamadan, ilacı kesmeden veya dozu arttırıp azaltmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİNTİON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle eş zamanlı kullanılmasında sakınca yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. ZİNTİON'un hamileliğe olan etkileri konusunda bir çalışma bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza danışınız. ZİNTİON'un etkin maddesi olan zink piritionun anne sütüne geçip geçmediği konusunda bir çalışma bulunmamaktadır.

Araç ve makine kullanımı

ZİNTİON'un araç ve makine kullanımı ve dikkatinizi tam olarak vermeniz gereken başka işlerin yapılması üzerindeki etkileri bulunmamaktadır.

ZİNTİON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZİNTİON süspansiyon, nipajin ve nipazol adındaki yardımcı maddeleri içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bilinen herhangi bir etkileşim bulunmamaktadır.

Zink piriton süspansiyonu ile etkileşime giren bazı ilaçlar olabilir. Zink piriton süspansiyonu deriden emilerek, çok eser miktarda da olsa, kan dolaşımına girerse etkileşim meydana gelebilir ancak bu risk çok düşüktür.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ZİNTİON nasıl kullanılır?

ZİNTİON süspansiyonu doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde ve sıklıkta kullanınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- ZİNTİON, haftada iki kez uygulanır. Yapılan araştırmalar 1-2 haftalık uygulamadan sonra kepeklenme ve yağlanma gibi seboreik bozuklukların ortadan kalktığını göstermektedir.
- Günde 1 seferden fazla kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Saçlı deriye uygulanır.

ZİNTİON'un kullanılması gayet basittir ve kullanılmadan önce şişenin çalkalanması tavsiye edilir.

- Saçları ve deriyi tamamen ıslattıktan sonra saçların köpürmesine yetecek miktar ZİNTİON uygulanır; genellikle bir avuç içi dolusu ZİNTİON yeterli gelecektir. Saçlara ve baş derisine belli bir müddet ovularak masaj yapılarak uygulandıktan sonra baş su ile durulanır.
- İkinci kez ZİNTİON aynı şekilde uygulanır ve bu sefer 5-6 dakika saçlı deride bırakılır.
- Saçlar daha sonra bol suyla durulanır ve kurulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

ZİNTİON süspansiyonun 2 yaşından küçük çocuklarda doktora danışılmadan kullanılması tavsiye edilmez. Çocuklarda ZİNTİON kullanımı konusunda mutlaka doktorunuza danışınız.

Yaşlılarda kullanım:

Veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Veri bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Veri bulunmamaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZİNTİON kullandıysanız:

ZİNTİON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZİNTİON'u kullanmayı unutursanız

Eğer ZİNTİON kullanmayı unutmuşsanız, hatırladığınız anda kullanmalısınız. Devamında da doktor veya eczacınızın tavsiye ettiği şekilde kullanmalısınız.

ZİNTİON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ZİNTİON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuzdan habersiz tedaviyi erken kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZİNTİON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bunların en yaygın olanları genellikle hafif şiddettedir ve muhtemelen kısa bir süre sonra kaybolurlar.

ZİNTİON kullanımı ile ilgili herhangi bir yaygın yan etki bildirilmemiştir.

Aşağıdaki CİDDİ yan etkilerden biri oluşursa derhal doktorunuza veya bir sağlık kuruluşuna gidiniz.

- Şiddetli alerjik reaksiyonlar (döküntü, ürtiker, nefes darlığı, göğüste sıkışma, ağız, yüz, dudak, ya da dilin şişmesi); cilt tahrişi.

Uzun süreli kullanımda periferik nörotis (sinirlere ilişkin bir hastalık), parestezi (yanma, batma, karıncalanma gibi anormal bir his) ve kaslarda zayıflık görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatı'nda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ZİNTİON'un saklanması

ZİNTİON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ZİNTİON'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZİNTİON'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Drogan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370 Sok. No:7/3
Balgat-ANKARA

Üretim yeri: Drogan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
06760 Çubuk-ANKARA

Bu kullanma talimatı ../../. tarihinde onaylanmıştır.